COVID 19 ИНФЕКЦИЯСИДА ҚЎЛЛАНГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ КАСАЛЛИК ОҒИРЛИК ДАРАЖАСИ КЕСИМИДА ФАРМАКОЛОГИК ГУРУҲЛАР ВА САВДО НОМЛАРИ БЎЙИЧА ТАСНИФИ (ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЧАСТОТАЛИ ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ)

Мавлянов И.Р., Мавлянов З.И., Олимов А.Р.
Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази. Тошкент, Ўзбекистон.

Маълумки, COVID 19 инфекцияси турли оғирлик даражасида кечади. Беморларда даво тактикаси ҳам касаллик оғирлик даражасига мос бўлиши муҳимдир. Шу туфайли медикаментоз даво таркибидаги дори воситалари гуруҳлари ва қўлланган препаратларни касаллик оғирлик даражаси бўйича таҳлил этиш ва даво самарадорлигини баҳолаш амалий фармакотерапиянинг асосий вазифалари сирасига киради.

Изланиш мақсади COVID 19 инфекциясига чалинган беморлар медикаментоз даво структурасида қўлланган дори воситаларининг фармакологик гуруҳ ва савдо номлари бўйича частотали тахлилини касаллик оғирлик даражаси кесимида ўрганишдан иборат бўлди.

Изланиш материаллари ва усуллари. Тадқиқотлар 2002 та COVID 19 инфекциясига чалинган ва стационар даво олган беморлар тиббий ҳужжатларида қайд этилган дори воситалари гурухлари улушлари ва ҳар бир гуруҳга мансуб бўлган дори воситаларининг савдо номи бўйича миқдорини ўрганиш учун ўтказилди. Беморлар касаллик кечуви оғирлик дарасига қараб 3 гуруҳга: оғир (1407 та бемор), ўртача оғир (466 та бемор) ва енгил (127 та бемор) гуруҳларга бўлинди. Дори воситалари гуруҳлари ва ҳар бир гуруҳга мансуб дори воситаларини ўрганишда фармакоэпидемиологияни частотали таҳлил усулидан фойдаланилди.

Тадқиқотда олинган натижалари. Тадқиқотлар COVID 19 инфекциясининг оғир даражадаги кечувига эга беморлар стационар даво жараёнида 14 та фармакологик гуруҳларга оид 130 та савдо номига эга дори воситалари қўлланганлиги, уларнинг 76,92%ни антибиотклар (37,69%), вирусга қарши (13,08%), яллиғланишга қарши стероид (4,61% ва ностероид (8,46%) дори воситалари анитикаогулянт (7,69%) ва антиантиагрегантлар (5,36%) ташкил этганлигини кўрсатди. COVID 19 инфекциясининг ўртача оғир даражадаги кечувига эга беморлар эса конкрет савдо номига эга препаратлар сони қарийб 2 баробарга, касаллик енги шаклда кечган беморларда мос равишда қарийб 3 баробарга камайганлиги аниқланди. Шунингдек, қўлланган дори гуруҳлари ичида касаллик оғирлик даражасига мос равишда антибиотиклар улушини камайиши ва яллиғланишга қарши ностероид дори воситалари, ҳамда қон ивиш тизимини пасайтирувчи препаратлар улушини ортганлиги кузатилган (касаллик ўртача оғирлик даражасида антикаогулянтлар улуши ва касалликни енгил кечувида антиагрегантлар улуши). Шу билан қаторда 2 даражали, яъни симтоматик даво мақсадида қўлланган дори воситалари гуруҳлари ва савдо номидаги препаратлари сони ҳам касаллик оғирлик даражасини пасайишига мос равишда кам улушларга эга бўлган.

Хулоса. Шундай қилиб, COVID 19 инфекциясига чалинган беморларда қўлланган дори воситалари гуруҳлари, ҳамда этиологик ва патогенетик давога мос бўлган дори воситалари улушлари ва касаллик кечуви оғирлик даражалари ўртасида ўзига хос боғликлик тендецияси мавжуддир. Аммо, ўтказилган таҳлил қўлланилган дори воситаларини дори шакли бирликлари бўйича ўртача ҳажмини аниқлаш ва касаллик оғирлик даражасига мувофиқлигини тадқиқ этишни ҳам тақазо этади.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У СПОРТСМЕНОВ В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД

Е.А. Теняева, Е.А. Турова, В.А. Бадтиева
Государственное автономное учреждение здравоохранения Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины им. С.И. Спасокукоцкого. Департамента здравоохранения г. Москвы, Россия.

Актуальность. По данным систематических обзоров имеются совокупные доказательства того, что эндокринная система особенно уязвима как для разрушения, так и для изменения функции вследствие COVID-19. В острый период у госпитализированных пациентов часто выявлялся тиреотоксикоз, подострый тиреоидит, тогда как в период реконвалесценции, функция щитовидной железы часто нормализуется, однако, некоторые исследователи отмечают повышенный риск развития аутоиммунных заболеваний.

До настоящего времени основные публикации о нарушениях эндокринной системы вследствие Covid-19 посвящены острому и подострому периоду заболевания, тогда как отдаленные последствия освещены недостаточно, тем более в популяции спортсменов.

Цель исследования: изучить влияние перенесенной коронавирусной инфекции на эндокринную систему спортсменов.

Материалы и методы: Проанализированы результаты углубленного медицинского обследования (УМО) 7509 спортсменов - членов сборных команд Москвы, прошедших УМО в 2021 году на базе филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ, имеющих в анамнезе инфицирование Covid-19 или отсутствие такового за период 2020 и 2021 гг. Обследование включало анализ спортивного и